Microram 20 Flow

Fungicida in sospensione liquida a base di ossicloruro di rame

Registrazione del ministero della Salute n 13402 del 12/15/2006

COMPOSIZIONE
Rame metallico (ossicloruro): 20 g (284 g/L), Coformulanti q.b 100 g.
DEFINIZIONE
Fungicida in sospensione liquida a base di ossicloruro di rame
MODALITÀ DI UTILIZZO
Fogliare
FORMA
Liquida
FORMULAZIONE
Sospensione concentrata
CONFEZIONE
Taniche da 10 L

Taniche
10 L

Microram 20 Flow è un fungicida in sospensione liquida a base di ossicloruro di rame, ad azione preventiva e dotato di una notevole efficacia e persistenza. L'alto grado di micronizzazione delle particelle di rame assicura un'omogenea ed uniforme copertura della vegetazione trattata anche alle dosi più basse. La formulazione in pasta fluida garantisce un'elevata adesività e resistenza al dilavamento, abbinata ad una praticità nel dosaggio ed alla sicurezza per l'operatore.

COLTURA	AVVERSITÀ	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSI D'IMPIEGO	DOSI/ HA	N MAX TRATT./ ANNO	INTERVALLO TRA I TRATT.
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno	Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi (Pseudomonas spp), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora	- Tratt. autunnali - Tratt. di fine inverno - Tratt. post-fiorali	260-420 ml/ hl 260-420 ml/hl 70-170 ml/hl	2,6-4,2 lt 2,6-4,2 lt 0,7-1,7 lt	2 2 4	7-21
Drupacee Pesco, Albicocco, Susino, Ci liegio, Nespolo per trattamenti pre fioritura e di chiusura. Solo Pesco, e ciliegio per trattamenti post fioritura.	Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stigmina carpophila), Monilia (Monilia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.)	- Tratt. autunnali - Tratt. di fine inverno - Tratt. post-fiorali	210-440 ml/ hl 210-440 ml/hl 70-130 ml/hl	2,1-4,4 lt 2,1-4,4 lt 0,7-1,3 lt	2 2 5	14-21
Vite	Peronospora (Plasmopara viticola), Batteriosi, Antracnosi	- Tratt. pre-fiorali - Tratt. post-fiorali - Tratt. di "chiusura"	170-420 ml/hl	1,7-4,2 lt Massimo 21 lt/ha di prodotto per anno	8	7-14
Olivo	Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine	Tratt. di fine inverno e all'invaiatura	260-440 ml/hl	2,6-4,4 lt	4	14-30
Carciofo, Asparago	Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi	Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni	160-660 ml/hl	1,75-3,2 lt	5	7-14
Agrumi	Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophthora citricola), Batteriosi (Pseudomonas syringae), Allupatura	Tratt. a partire da fine inverno	180-220 ml/hl	2,7-3,3 lt	5	7-14
Noce, Nocciolo ed altri Fruttiferi a Guscio	Batteriosi (Xanthomonas spp, Pseudomonas spp.), Cytospora sp.	Tratt. primaverili estivi e trattamenti autunno - vernini	115-450 ml/hl	1,7-6,7 lt	3	14-21
Fragola in campo	Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae)	dalla ripresa vegetativa	325-700 ml/hl	2,6-3,5 lt	5	7
Lattughe e altre insalate in campo (con esclusione di spinacio e simili)	Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi	icarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	310-700 ml/hl	2,5-3,5 lt	5	7-14
Cavoli a Infiorescenza (broccoli, cavolfiore) in campo	Peronospora (Phytophthora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)		210-660 ml/hl	1,7-3,3 lt	5	7-14
Cucurbitacee (cetriolo, cetriolino zucca, zucchino, melone, cocomero) in campo e serra	Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.)		300-500 ml/hl	2,4-2,5 lt Massimo 21 lt/ha di prodotto per anno	4 per cetriolo, cetriolino e zucchino; 6 per zucca, melone e cocomero	7-14
Peperone in campo e serra	Peronospora (Phytophthora spp.), Marciume pedale (Phytophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.)		210-660 ml/hl	1,7-3,3 lt	5	7-14
Pomodoro, Melanzana in campo e serra	Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)		210-880 ml/hl	1,7-4,4 lt	6	7-14
Patata	Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.)		325-880 ml/hl	2,6-4,4 lt	6	7-14
Ortaggi a radice (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.) (con esclusione di barbabietola da zucchero)	Alternaria (Alternaria spp.), Cercosporiosi (Cercospora spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)		210-700 ml/hl	1,7-3,5 lt	5	7-14
Fagiolo, Pisello e altri Legumi	Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophthora phaseoli-pisi), Septoria (Septoria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)		210-660 ml/hl	1,7-3,3 lt	5	7-14
Floreali, Ornamentali e Forestali in campo e serra	Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septo- ria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiola- tura della rosa (Diplocarpon roseae), Fumaggini		155-220ml/ hl	2,3-3,3 lt	3	7-14
Ortaggi a Bulbo (aglio, cipolla, cipollina, scalogno)	Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Pero- nospora destructor)		310-700ml/ hl	2,5-3,5 lt	5	7-14

Indicazioni di pericolo